

# Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD B.P. 177 21205 BEAUNE Cedex

ABONNEMENT ANNUEL : 220 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 3 500 28 D



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 22 - 8 novembre 1991

**COLZA : Situation ravageurs**  
**CEREALES : Peu de pucerons mais à surveiller**

## COLZA

### — ALTISES - CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL :

Les premières larves peuvent être observées dans les pétioles (larves noires aux deux extrémités) en situations non protégées où des populations moyennes à importantes d'adultes ont été notées.

On observe des piqûres de charançon du bourgeon terminal (boursouflures du pétiole). Il est encore trop tôt pour trouver les œufs ou les larves.

### — PUCERONS : Pas d'évolution.

**PRECONISATION :** Aucune intervention n'est actuellement justifiée. D'éventuelles interventions de rattrapage (altises + charançons) ne doivent être envisagées qu'un peu plus tard, en présence des jeunes larves de charançon.

## CEREALES

**STADES :** De la levée à 3 feuilles, voire 1 talle (orges)

### — PUCERONS

Les populations restent faibles, le plus souvent limitées à quelques pour cent de pieds porteurs, pouvant atteindre localement 10 à 15 % pour des levées précoces. Le vol est ralenti avec les conditions météorologiques actuelles, d'où une présence limitée sur les levées récentes.

Surveiller les parcelles. Les situations avoisinant 10 % de pieds porteurs devraient être protégées rapidement.

En présence de populations faibles, l'intervention, moins urgente, sera cependant à réaliser dès que possible.

### — CICADELLES


Les captures en cuvettes sont très faibles et l'activité est également faible avec les conditions météorologiques actuelles.

Dans les situations qui ont pu justifier une intervention, celle-ci a dû être réalisée les semaines précédentes. Le risque devient maintenant très limité sauf situation peu probable de remontée durable des températures.

**— LIMACES :** Très actives, les limaces sont à surveiller, en particulier en situations à risque. Intervenir rapidement si nécessaire avec : bensultap (Malice) 7,5 kg/ha, mercaptodiméthur (Mesuro) 3 à 5 kg/ha, métaldéhyde (Nombreuses spécialités) 5 à 10 kg/ha, thiodicarbe (Skipper) 5 kg/ha.

# PUCERONS DU COLZA

Evolution des captures à la Tour d'Auxerre



—■— BREVICORYNE

-x- MYZUS

# PUCERONS DES CEREALES (R. padi)

Evolution des captures à la Tour d'Auxerre

